

Méhészeti termékek fogyasztásával óvja, védje egészségét!

Postán utánvétellel megrendelhető, legkisebb tétel 2 üveg vagy naturban 8 dkg vagy 2 tégely balzsam



A TÁJÉKOZTATÓT KÉREM MÁSNAK IS ÁTADNI

PROPOLISZTINKTÚRA GYÓGYHATÁSAI

TÁJÉKOZTATÓ

Megrendelhető: BOROS KÁROLY méhész



A TÁJÉKOZTATÓ MINDEN SORÁT OLVASSA EL!

Table with 4 columns: ÉRRENDSZERI MEGBETEGEDÉS ESETÉN, GYULLADÁSOS BETEGSÉGEK, FÁJDALOM CSILLAPÍTÁS, BAKTÉRIÁLIS FERTŐZÉSEK KEZELÉSE, GOMBÁS FERTŐZÉSEK KEZELÉSE. Rows include: Magas vérnyomás, Érelmeszesedés, Érszűkület, értágítás, Szívproblémák kezelésére, idegpanaszokra, Visszérgyulladásra, Véraláfutás, beverzés, zúzódás.

Propoliszos balzsam. Derék-, gerinc-, lábfejdagadatra, Visszérgyulladásra, sarokrepedésre. Körmögomba ellen, izületi, reumatikus bántalmakra. Pattanásos arcbőrre, bőrbetegségekre, lumbágóra.

ITTAS EMBERT KIJÓZANÍT, FÉRFIAKNÁL POTENCIÁT NÖVEL

Lásd a részletes tájékoztatót is!

Termékek megrendelhetők: BOROS KÁROLY méhész 8360 Keszthely, Kócsag u. 6. T.: 30/3511-500 fax: 83/511-500

Részletes tájékoztató

A méheimtől gyűjtött propolisz a Zala megyei Áll. és Élelmiszer Ell. Állomás Élelmiszervizsgáló Laboratóriuma által végzett vizsgálatok szerint - megfelel a MSZ 08-0200-79 minőségi követelménynek, propoliszos készítmények előállításához felhasználható.

Mi a propolisz és honnan származik? A propolisz illatos, balzsamozó anyag, melyet a fák rügyeiről gyűjtenek a méhek. Természetes vegyületek, 50-60 %-ban gyantaféléket és balzsamokat, 10-30 %-ban viaszt, 8-10 %-ban illóolajokat, 5 %-ban virágpórt és kisebb mennyiségben még számos ismert és ismeretlen anyagot tartalmaz. /Wallner E 1983. Ghisalbert 1979./ A méhek fertőtlenítő, tartósító, gyógyító és építőanyagként használják.

A biológiai és farmakológiai vizsgálatok szerint megszültető hatással van többféle felületi és /Lavie P. 1960./ Bizonyos méregtől regenerációs, -dermaplasztikus, biostimuláns hatása van. Kokainnál 3x, novokainnál 5x jobb fájdalomcsillapító. Mikróba pusztító hatását fel lehet használni a fertőzések, gyulladások megelőzésében.

A propolisz természetes, s elsősorban a tinktura legfőbb tulajdonsága, hogy a szervezet immunrendszerét erősíti, szükség esetén azt egészíti ki vagy egyes funkcióknál azt helyettesíti. Gyerekeknél és idősekben a legfontosabb. Egyensúlyt tart fenn, s az egészséges állapotot igyekszik visszaállítani és azt megtartani. Az őri-ási előnye tehát a gyógyszerrel szemben, hogy nem függeszti fel a szervezet természetes védekező rendszerét. Aktíválja a gamma globulint.

A flavonoidok - mint tulsulyban lévő elemek - nem kevesebb mint 41 féle gyógyhatással rendelkeznek. Fontos a vizelethajtó, epékiválasztást serkentő, ösztrogén és belső kiválasztású mirigyekre /csecsemő, pajzs-, hasnyál-, mellékvese mirigyekre/ gyakorolt hatásuk. Ezen felül bakterium-, vírus-, parazita- és alvadáscellenes hatások is számottevő. /"A piterápia ma" Bucuresti 1982./

A hazai propolisz gyógyhatásait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen vizsgálták és igazolták bakterium-, gombaeellenes, gyulladáscsökkentő helyiérzéstelenítő hatását. Hajsztálér-ellenállást növelő és regeneráló hatása felülmúlja a Venoruton kenőcsöt.

A propolisztinktura igen jó eredménnyel alkalmazható: bakteriumok okozta fertőzések, krónikus baktériális betegségek gyógyításánál: légúti fertőzések, nátha, garat-, mandula-, középfülgyulladásnál, tüdőgyulladásnál, időült asztmában, gyomor-, nyombélfekély, vastagbélgyulladásnál, epe-, vese-, huygutak gyulladásos panaszainál, hepatitis, májgyulladás, prosztatagyulladás, szivizomgyulladás esetén. A propolisz görcsoldó, vizelethajtó, helyiérzéstelenítő hatása segíti a szervezet gyors gyógyulását.

A hajsztálér rendszerre kifejtett hatása miatt a propolisztinktura igen eredményesen alkalmazható törés, zúzódás, lábszárfekély, felfekvés okozta sebek kezelésére, visszérnyomás kezelésére, mélyvénás trombózis okozta fájdalom kezelésére, csontszövet, porcszövet regenerálására. Értágító hatása miatt alkalmazható magasvérnyomásos betegek kezelésére, helyileg érszűkület kezelésére, szivpanaszok enyhítésére a természetes javításra stb.

Gyulladáscsökkentő, helyiérzéstelenítő hatása miatt igen jó eredménnyel alkalmazható izületi fájdalmak, gyulladásos folyamatok enyhítésére, reumás-, izületi-gyulladások kezelésére, kar, váll, hát, gerinctáji fájdalmak enyhítésére, lumbágó, lábfájdalom csökkentésére. Kezelésre nem izomláz, csökken a fáradékonyság, az izomláz.

Gombaeellenes hatása révén jól alkalmazható szájpenész, Candida gombák okozta fehér hüvelyfolyás ellen és a hajlatok, kéz, láb, köröm-gombásodása esetén.

Jó nyugtató hatású. Ideges fejfájás, klimax okozta fejfájás, fülzúgás, egyensúlyzavarok, idegkimerülés, álmatlanság esetén is hatásos.

Fogfájás, fogínygyulladás esetén is jó hatású, valamint foggyökér regenerálását segítő hatása is van.

Idős emberek roborálására alkalmas különösen olyan esetekben, amikor a szervezet nagyfokú legyöngyülése áll fenn.

Alkohol, nikotin okozta mérgezés esetén méregteleníti a szervezetet.

A legkülönfélébb bőrbetegség esetén jó hatást fejt ki: égés, fagyás, allergia,

ekcéma, gombák, bakteriumok okozta fertőzések, sebek kezelésére, lábszárfekély, pattanás, kéz-, láb-, köröm- gombafertőzésénél, viszketés esetén, tyukszem fájdalom esetén stb.

Hogyan használjuk - néhány fontosabb esetben - a propolisztinkturát?!

- 1./ Légúti fertőzés esetén, mandulagyulladás, torokfájás, meghűlés stb.: 30 csepp 1 dl meleg teában feloldva, naponta többször gargalizálunk vele, majd lenyeljük, vagy mokkacukorra csepegtetjük és azt kell megenni.
2./ Lázas megbetegedések: napi 3x30 csepp /1 mokkáskanálnyi tinktura= 30 csepp/
3./ Fogfájás, innyulladás: tinktúra spray-t is használni.
4./ Gyomor- és nyombélfekély: Reggel éhgyomorra 30 csepp tinkturát 1 dl meleg tejjel megiszunk, este vacsora előtt.
5./ Gyomor- és nyombélfekély: Reggel éhgyomorra 30 csepp tinkturát 1 dl meleg vízben 30 csepp.
6./ Epe-, vese-, és májgyulladás, huygutak fertőzése: 2x30 csepp meleg teával naponta. Minden 2. héten szüneteltetjük a kúrát.
7./ Vastagbélgyulladásra kiváló napi 3x30 csepp citromos teával.
8./ Magas vérnyomás: naponta lefekvés előtt 30 csepp gyógyulásig, idősebb korban napi 2x30 csepp.
9./ Dagadt megbetegedéseknél: Reggel éhgyomorra 30 csepp kamillateával.
10./ Klimax bekövetkezésekor: napi 2x30 csepp.
11./ Prostatagyulladás: 3x30 csepp 1 dl meleg vízben v. teában.
12./ Idegkimerülésre egyéb idegpanaszokra igen jó hatással van napi 3x30 csepp pl. teával.
13./ Bőrbetegségek: főleg nyitott ekcémánál, pikkelysömörnél, külső sebeknél, gennyes sebeknél, égészeknél, pattanásnál, fekélyeknél, érszűkületnél, felfekvés okozta sebeknél, tyukszemnél, sömöröknel stb... a beteg területet megtisztítjuk, majd naponta többször becseszeljük. /Allergiás tünetek előfordulhatnak/ Ajánlott belsőleg is fogyasztani a jobb hatás érdekében pl. napi 2x30 cs.
14./ A propolisz tinktura gátolja a rosszindulatú daganatok növekedését. Gyógyítja a rákos képződményeket a testfelületen. Alkalmazása: este lefekvés, s tinktúrával bekenjük. Ezen kívül reggel-este éhgyomorra 2xl kávéskanál tinkturát megiszunk citromos teával.
15./ Izületi, reumás gyulladásoknál, kar, kéz, láb, gerinctáji fájdalmak, visszérnyomás, mélyvénás trombózis esetén alkalmazható a propolisztinktura bedörzsölve, de kedvezőbb hatást mutat propoliszes kenőcs formájában.
16./ Itt a s embert kijózanít 1 mokkáskanál tinktura 1 dl hideg vízben.
17./ Koszorúér meszesedés, érelmeszesedés, érszűkület esetén napi 3x30 csepp

A tinktura minden olyan problémánál kipróbálható, ahol egyéb természetes gyógyszerek nem értek el hatást, vagy nem létezők.

Propolisztinktura fogyasztása: Általános javallattal felnőtteknek napi 3xl vagy 2xl,5 mokkáskanállal. Reggel-délben evés előtt, este lefekvés előtt pár órával. Gyerekeknek - 1 éves kortól - pl. mokkacukorral - naponta legalább annyi csepp, ahány kg a gyermek testsúlya. Mivel a propolisztinktura tömény állapotban van, így belsőleg csak hígítva fogyasztható. Légszűkület esetén alkalmazhatjuk. Leggyakrabban teával, vízzel fogyasztani, de lehet mokkacukorra vagy kekszre csepegtetni is. /Ebben az esetben nyál hígítja meg/ Folyamatos használat esetén minden üveg elfogyasztása után ajánlott legalább 1 hét szünet. Tapasztalatok szerint ahányadik üveg fogyott el annyi hét szünetet kell tartani a következőig. Gyerekeknek hetente ajánlott szünetet tartani. Kedvező hatása van cukorbetegségnek is, de ők nem fogyaszthatják mézzel, vagy cukorral, csak teával stb...

A gyógyulás ill. az állandó egészséges állapot fenntartása érdekében rövidebb-hosszabb kúrát kell végezni. Általában egy felnőttnek egy kondicionáló kúrához elegendő 2 dl tinktura elfogyasztása kb. 7-8 hét alatt. Kiseb betegségeknek, elgyengüléses állapotoknál, 3-4 üveg tinkturát kell

fogyasztani. Hosszantartó betegségeknek, elváltozásoknak vagy olyan esetben, amikor a betegség nem gyógyítható. Ilyen betegségek pl. érelmeszesedés, csontmeszesedés, érszűkület, régióta meglévő izületi és reumatikus bántalmak, nehezen gyógyítható daganatos és gyulladásos megbetegedések, a szervezet nagymértű legyöngyülése, stb...

A tinktura keserű és, főleg hatására fehéres színűvé válik.

A propolisz készítmények nem csodaszerek, de! rendszeres fogyasztása esetén azonnal hatásos eredményeket ill. gyógyulást lehet elérni, olyan esetekben is, ahol a hagyományos gyógyszerek esetleg évek óta nem megfelelő hatást értek el. Különösen feltűnő a szervezet regeneráló képessége. /pl. fejlődésben elmaradt gyerekek, egyéb legyengült szervezetek esetében.

Gyógyulást már a 4-5. napon éreztebbi kedvezőtlen hatását. Több esetben azonban csak ennél később, orr része gyógyulását tovább kell folytatni. Torokgyulladásnál, külső sebeknél stb... viszont szinte azonnal hat.

Csökkent a gyomorsav, ezért szűkség esetén ajánlott limonáddal, vagy citromos teával együtt fogyasztani. /Dr. Szalay/

Távhatása nagyon jelentős. A vérrendszert segítőségével gyulladást gátol. /pl. agyhártya, vese, máj, egyéb agyi betegségek stb./ Erős fájdalomcsillapító hatása van. Receptorokra 2 percen belül, ideggyökön át 10 percen belül hat.

Különböző izületi gyulladásoknál, daganatoknál használható a tinktura. Bedörzsöljük a beteg felületre, naponta többször, éjszakra be is lehet kötni a bedörzsölt helyet. Beroगतáshoz: 3 rész tinktura, 1 rész víz keveréket kell használni. /Felhasználva: Dr. Szalay László előadása/

Gégebajokra gyógyító hatással van. /Dorosenko P.N. 1975./

Ellentétben a gyógyszerekkel, a tinktura folyamatosan hosszabb ideig is szedhető, káros mellékhatása nincs /Donadu J. 1980./ szervezetben nem halmozódik fel. Ez tehát azt jelenti, hogy éveken keresztül is szedhető egy napi beállított kisebb mennyiséggel. /pl. 2xl mokkáskanál naponta./

Allergia esetén fellépő tünetek: Kis hegyes viszkető pattanások a bőrfelületén, szemhéj piros lesz, orr alsó része kipirosodik és viszket, nehéz légzés, ritkább esetben erős vérnyomáscsökkenés. Ha ujbóli fogyasztásnál ismét jelentkeznek a tünetek, akkor nem ajánlott a propolisz alkalmazása.

Huzamosabb belsőleges kezelés esetén aluszékonyság, nehéz légzés, vese probléma lehetséges. Ilyen esetben orvosi ellenőrzés szükséges.

Fogyasztani tilos: pajzsirigy túltengésben szenvedőknek és propoliszra allergiásoknak. Alacsony vérnyomásban szenvedők kuraszerűen nem szedik, csökkenti a vérnyomást. /Általában feketekávé fogyasztása viszont ellensúlyozza a vérnyomáscsökkenést./

A nyers propoliszt a molyok megtámadják, erjedhet, barnulhat, ezért ajánlott hűtőszekrényben tartani. Általában a tinktura mézbe keverve, vagy apró darabokként. 1 heti adag lehet pl. 4 dkg, utána 1 hét szünet, ismét 4 dkg, stb...

Propoliszos itóká készítése: 1 liter 40-50-53 %-os konyakhöz vagy pálinkához 2-3-4 dkg - hűtőből kivett - apróra tört propoliszt teszünk. Sütőt üvegen naponta felrázunk, 5-10 nap után szűrjük le, naponta fogyasztható.

A természetes gyógyhatású anyagok - így a méhészeti termékek - sem helyettesíthetik az orvosi kezeléseket.

Kedvező eredményeket lehet azonban elérni gyógyhatásuk miatt részben a megelőzésben, részben az orvosi kezelések hatásosságának növelésében. Tapasztalatok szerint azonban reménytelennek tűnő esetekben is sokszor meglepő javulást eredményeznek.

Ellenőrzött garantált minőség!

Szerk.: Boros Károly méhész Keszthely 1986

Irodalom

- Tóth-Pápay V, Tóth L., Soltész M., Nagy É., Litkei Gy., Dinya Z., Sallai J., Gábor M., Szeged Orvostudományi Egyetem előadása XXXth Apimondia Congress 11-16 October Nagoya, Japan
- A propolisz és a propolisztinktura használata. Tájékoztató, szerk.: Boros Károly 1985